

Festsitzende Versorgung Stahlkunststoff

Die festsitzende Stahlkunststoffversorgung wird durch Schrauben auf den Implantaten fixiert und ist nur durch den behandelnden Zahnarzt abnehmbar. Die Stahlkunststoffversorgung unterscheidet sich von der Vollkeramikvariante nur im verwendeten Material und in der Verarbeitung.

- Wird fix mit 6-8 Implantaten im Kiefer verschraubt
- Wird sehr schlank modelliert und ist gaumenfrei
- Angenehmes, natürliches Gefühl im Mund
- Ästhetisch sehr ansprechend, steigert dadurch ihr Selbstwertgefühl
- Individuelle Anpassung in Form und Farbe (Fotos von früher)
- Bei OP's im Krankenhaus braucht die Prothese nicht entnommen werden
- Bereits einen Tag nach der Implantation ist das vom Zahntechniker hergestellte ästhetisch ansprechende Sofortprovisorium fertig
- Je nach Situation wird nach 3-6 Monaten mit der definitiven Versorgung begonnen
- Gereinigt wird mit Zahnpaste (Parodontax), Floss und Interdentalbürstchen
- Nach dem Verlust der Zähne gibt die festsitzende Versorgung wieder emotionale Sicherheit und Wohlbefinden
- Unterfütterungen, Korrekturen und diverse Reparaturen können jederzeit vorgenommen werden

Provisorische Versorgung bei Sinuslift (Knochenaufbau)

- Sollte bei Ihnen ein Sinuslift notwendig sein, werden im vorderen Bereich Implantate gesetzt, worauf ein Sofortprovisorium befestigt werden kann.
- Nach einer Einheilphase des Sinusliftes von ca. 6 Monaten können die restlichen Implantate im hinteren Bereich gesetzt werden und nach einer weiteren Einheilzeit von ca. 6 Monaten wird mit der definitiven Versorgung begonnen.

Nehmen sie bitte am Vortag abends und morgens der OP ein Antibiotika ein, dass Sie bei uns in der Praxis erhalten.

VOR DER VERSORGUNG

OBERKIEFER



UNTERKIEFER



FRONT



SEITLICH



NACH DER VERSORGUNG

OBERKIEFER



UNTERKIEFER



FRONT



SEITLICH



Zu beachten:

Für die Dauer bis zur definitiven Versorgung auf ausschließlich weiche Kost achten

z.B. Knödel, Pasta asciutta, weiches Brot, weiches Fleisch

Tipps zur wundgerechten Ernährung

Sie sollten erst wieder etwas essen und heiße Getränke zu sich nehmen, wenn die lokale Betäubung vollständig abgeklungen ist. Andernfalls kann es passieren, dass Sie sich verbrennen oder auf Zunge bzw. Wange beißen. Achten Sie darauf, möglichst weiche Nahrung zu sich zu nehmen und verzichten Sie auf Körner, Müsli, Nüsse und Früchte mit kleinen Samen. Verzichten Sie auf den Genuss von Milchprodukten und säurehaltigen Nahrungsmitteln für ca. drei Tage nach der Operation. Vermeiden Sie Nikotin, Kaffee und Alkohol. Diese Stoffe beeinträchtigen die Wundheilung.

Tipps für den OP-Tag

- Verzichten sie auf Schmuck im Kopfbereich
- Tragen sie bequeme Kleidung und Schuhe
- Bereiten Sie sich am Vortag etwas Weiches zum Essen vor, damit sie eine kleine Stärkung haben wenn sie nach Hause kommen
- Nehmen sie ein reichhaltiges Frühstück zu sich
- Bereiten Sie sich Kühlbeutel vor
- Organisieren Sie sich eine Fahrgelegenheit
- Gönnen Sie sich ein paar Tage Ruhe!